


CAPRIMULGIDAE

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

En France, nicheur peu commun au-dessus d'une ligne Le Havre - Besançon, commun au sud de cette ligne.

Nicheur peu commun localisé



Carte de répartition de l'Engoulevent d'Europe en période de nidification en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.

L'Engoulevent d'Europe est localisé au Morvan, à l'Autunois, au Bassin minier, au Massif d'Uchon, à la Côte Chalonnaise, la Côte Mâconnaise et au Brionnais. Dans les autres secteurs les observations sont très rares.

Il niche essentiellement dans les coupes forestières et les landes à buis, à genêts.

Il n'existe que 6 données de nidification certaine :

- le 05.07.1973, un nid avec 2 poussins dans une petite friche à bruyère à balais à Montcenis ;
- le 26.06.1974, un nid avec femelle couvant 2 œufs (friche à bruyère à balais de Montcenis), 2 poussins le 29.06.1974 et 2 juvéniles (bagués) le 04.07.1974 ;
- le 09.07.1997, 2 adultes et 2 jeunes à Cersot ;
- le 05.08.1998, 1 femelle avec 2 jeunes à Mercurey ;
- le 01.07.2000, 1 nid garni de 2 œufs, puis d'un poussin à Saint-Sernin-du-Bois ;
- le 23.05.2009, 1 nid garni de 2 œufs à Uchon ;
- le 27.06.2011, 1 femelle avec 1 jeune volant à Igé.



Robert MASSON


Engoulevent d'Europe.

Migrateur peu commun

Le départ se fait fin-août, quelques oiseaux étant encore observés mi-septembre. À noter, une donnée exceptionnellement tardive le 09.11.1997 à Aluze.

L'arrivée de l'Engoulevent d'Europe en Saône-et-Loire débute la dernière décade d'avril, culmine vers le 20 mai. Quelques observations précoces ont été effectuées début avril :


- 1 individu le 07.04.1995 à Curtil-sous-Burnand ;
- 1 individu le 10.04.2001 à Jalogny.



Phénologie saisonnière de l'Engoulevent d'Europe d'après les données de Saône-et-Loire de 1950 à 2010.

Données de baguage

Un mâle bagué presque adulte le 13.06.1968 à Goerle aux Pays-Bas est trouvé mort le 14.09.1969 à Bouzeron.



Carte de déplacement de l'Engoulevent d'Europe d'après les données de baguage.

Alain MICHON & Jean-Marc FROLET

APODIDAE

Martinet noir *Apus apus*

En France, nicheur et migrateur très commun, observations hivernales exceptionnelles.

Nicheur commun localisé

Pour LA COMBLE & POTY (1958), nicheur très commun en progression depuis 1945.

Se reproduit essentiellement sur les bâtiments dans des villes et villages répartis dans toute la Saône-et-Loire

et au moins à une reprise en falaise en 2005 et 2008 à la Source du Gouard, Carrière d'escalade à Remigny. La preuve de cette nidification n'est pas toujours facile à prouver et la notion de nicheur probable pour un oiseau toujours en vol n'apporte que peu de renseignements.

La nidification peut se poursuivre jusque mi-septembre (le 13.09.2001, nourrissage de jeunes en centre ville à Chalon-sur-Saône).