



de nidification le plus proche étant la Reculée de Baumes-les-Messieurs). Quelques observations du nord-ouest de la Saône-et-Loire sont peut-être celles d'oiseaux nichant à Vauchignon en Côte-d'Or.



Carte de répartition du Martinet à ventre blanc en période de nidification en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.




Localisation des données de Martinet à ventre blanc hors de la période de nidification en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.

Jean-Marc FROLET



Martinet à ventre blanc.



Phénologie saisonnière du Martinet à ventre blanc d'après les données de Saône-et-Loire de 1950 à 2009.

Données historiques et évolution

Migrateur accidentel ou irrégulier en Bresse, en avril et de fin juillet à début septembre, isolé ou en petites bandes : 1 sujet en vol le 28.04.1924, sur la Saïlle, 2 dans une bande de Martinets noirs le 20.07.1936 à Sagy (LA COMBLE & POTY, 1958).

Évolution

La nidification du Martinet à ventre blanc en bâtiment en Saône-et-Loire rend compte de la nouvelle extension vers le nord de l'aire de répartition du Martinet à ventre blanc en France. Elle est dans la continuité des découvertes faites dans le même milieu en Ardèche (avant 1979 à Aubenas et à Privas, puis Annonay en 1982), dans la Loire en 1989 à Saint-Étienne, puis dans le Rhône à Lyon, à Mulhouse et vers le nord-est à Strasbourg (ROLAND-COMMARMOT, 2004). Dans le même temps, il s'est installé en milieu naturel à Vauchignon en Côte-d'Or en 1992.

Jean-Marc FROLET

ALCEDINIDAE

■ Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

Espèce à large répartition paléarctique, indomalaise et australienne. En France, nicheur, migrateur et hivernant peu commun.

Nicheur sédentaire peu commun

Le Martin-pêcheur d'Europe niche en bordure des cours d'eau (sauf les petits ruisseaux) et des plans d'eau, en creusant un terrier dans les berges. En Saône-et-Loire, il niche essentiellement le long des grands cours d'eau (Loire, Saône et leurs affluents) et sur certains des étangs ou lacs du Bassin minier, du Charolais et de la Bresse.

Les couples sont visibles et parquent sur les sites de nidification dès la fin de l'hiver (date de parade précoce : le 06.12.2003 à Marnay). Le creusement du terrier commence en mars. Les citations de reproductions certaines (nid garni, nourrissage ou

Frédéric TILLIER




Martin-pêcheur d'Europe.

jeunes non émancipés) s'étalent de début avril à fin août. Il faut dire que le Martin-pêcheur peut faire trois (voire quatre ?) nichées. Les jeunes produits une année forment l'essentiel des reproducteurs de l'année suivante, la mortalité des adultes étant très forte d'une année sur l'autre.

Les densités connues sont de l'ordre de 3 couples pour 10 km de rivière sur le bassin de la Saône (ROCHÉ, 1989), mais les effectifs de l'espèce peuvent subir de très fortes variations. Les hivers très rudes, comme 1984-1985, déciment en effet presque totalement les populations, qui mettent plusieurs années à se rétablir.

L'étude menée sur la ZPS de la vallée de la Loire en 2003 fait état de 30 couples de Martin-pêcheurs soit 2,9 couples/10 km sur le lit mineur de la Loire entre Iguerande et Cronat (GRAND & MEZANI, 2003).




Carte de répartition du Martin-pêcheur en période de nidification en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.

Migrateur peu commun et hivernant commun

Les adultes sont considérés comme sédentaires, mais peuvent se déplacer de quelques kilomètres. Les jeunes se dispersent par contre dans toutes les directions (erratisme), quelquefois sur de grandes distances.

On connaît mal, en fait, ce qu'il se passe réellement en Saône-et-Loire. En Suisse, la migration de jeunes (exclusivement nocturne?) débute dès la mi-juillet, jusqu'à la mi-novembre. Le retour vers les territoires de nidification se ferait en février et mars (WINKLER, 1999).

LA COMBLE & POTY (1958) parlent d'un migrateur par erratisme, parfois très nombreux, dès la fin octobre jusqu'en janvier, comme l'ont observé MONTESSUS et BLANC dans la plaine de Saône.



Carte de répartition du Martin-pêcheur d'Europe hors de la période de nidification en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.

Données de baguage

Un adulte bagué le 15.05.1998 à Autun a été repris 8 jours plus tard puis le 19.06.1998 au même endroit.

Alain MICHON & Jean-Marc FROLET

MEROPIDAE

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

Niche en Europe méridionale jusqu'à la Turquie et le sud-ouest de la Sibérie ainsi que le Maghreb. En France, nicheur peu commun (dans les départements méditerranéens, la vallée du Rhône, en Bourgogne, dans le Jura, les vallées de la Loire et de l'Allier et en Île de France), localisé et migrateur rare.

Nicheur commun localisé

Il est abondant dans la vallée de la Loire (et sur tous ses affluents) et la vallée du Doubs, présent régulièrement en Bresse (dans la vallée de la Saône et ses affluents), en plus faible nombre dans le Bassin minier et le Val de Saône dans sa partie nord, et occasionnellement en divers points du département.

Un comptage réalisé en 2001 (GENTILIN, 2002c) donne un minimum de 400 couples. L'étude menée sur la ZPS de la vallée de la Loire en 2003 fait état de 188 couples nicheurs sur le lit mineur de la Loire entre Iguerande et Cronat (GRAND & MEZANI, 2003).

Frédéric TULLIER



Guêpier d'Europe.