

LE SANGLIER



CLASSE

Mammifères

ORDRE

Artiodactyles

FAMILLE

Suidés

GENRE

Sus

ESPÈCE

scrofa

NOM SCIENTIFIQUE

Sus scrofa



Laie

Taille : 1,1 - 1,8 m
Hauteur au garrot : 0,6 - 1,1 m
Poids : 35 - 170 kg

Danièle SIRUGUE

Morphologie

Les suidés sont des mammifères non ruminants, leurs canines sont développées et ils possèdent quatre onglons (partie cornée du sabot). Cet animal est puissant et trapu. Sa peau couleur gris ardoise lui a donné son surnom de « bête noire ». Son museau tronqué est terminé par un butoir où sont percées les narines.

Habitat

Le sanglier peut coloniser et exploiter tous les types de milieux avec une préférence quand même pour les forêts caducifoliées (qui perdent leurs feuilles à l'hiver). Il a besoin d'eau et d'une végétation assez haute lui permettant de se dissimuler.

Période de reproduction

C'est de la mi-novembre à la mi-janvier que la reproduction a lieu. Elle entraîne une intense perturbation de la vie sociale. La laie, sur le point de mettre bas, dissout momentanément son groupe familial et s'isole. La gestation dure environ 4 mois et la femelle prépare un nid « le chaudron » dans lequel elle y déposera sa progéniture. A la naissance, les marcassins ont une livrée rayée apparente jusqu'à 4 mois environ.

Régime alimentaire

Les choix alimentaires évoluent au gré des disponibilités. En fait, le sanglier est un véritable opportuniste. Il mange des fruits forestiers (glands, châtaignes, faines, ...), des céréales, des racines, des rhizomes, des tubercules et de la nourriture animale (invertébrés, petits mammifères, grenouilles, cadavres).



Relation avec l'Homme

Le sanglier est une espèce gibier recherchée pour sa viande et son trophée (les canines, les défenses et les grés). Les chasseurs ont mis en place une gestion cynégétique de l'espèce. Toujours considérés comme « nuisibles » dans toute la Bourgogne du fait des dégâts considérables aux cultures, les populations de sanglier ne sont pas menacées actuellement.



Daniel Sirocque

Marcassins



Réseau trophique

Le Loup peut-être perçu comme un prédateur naturel du Sanglier en France. Mais en Bourgogne, il n'y a plus que l'Homme qui peut-être considéré comme prédateur de cette espèce au travers de la chasse.

Répartition géographique

L'espèce est largement représentée au niveau mondial. Elle occupe des habitats très diversifiés (milieux semi-désertiques, en limite de toundra, milieux forestiers humides, ...).

Daniel Sirocque