

LA FOUINE

Martes foina



Fouine

COLOCATAIRE DE BON AUGURE ?

La Fouine a une fourrure composée d'un duvet gris clair et de longs poils foncés qui laissent apparaître le duvet. Une tache blanche, appelée bavette, s'étend de la gorge jusqu'aux pattes avant. Ses abris et gîtes sont très divers : tas de paille, vieux murs, ronciers, arbres, falaises, tas de bois, sous-toitures des greniers, dépendances tranquilles, ruines.

Attention à ne pas la confondre avec la martre !



Elle a une prédilection pour les environnements rocheux contrairement à la Martre des pins, plus forestière. Cette différence d'utilisation du milieu diminue la compétition entre les deux espèces de morphologie semblable. Dans un paysage agricole, les lisières, haies, bosquets et alentours des villages sont bien fréquentés contrairement aux champs et aux prairies qui sont évités. Sa plasticité comportementale fait qu'on la rencontre même au centre des villes comme Saulieu, Château-Chinon, Dijon et Auxerre. Les maisons, granges, hangars calmes sont visités. À ces constructions, s'ajoutent également les églises.

CARNIVORE DE NOS VILLAGES

La fouine récolte une partie de sa nourriture au hasard de ses déplacements quotidiens dans des sites privilégiés. Les vergers, les poulaillers, les granges, les dorts de passereaux sont exploités régulièrement.

Elle consomme principalement des fruits, notamment des cerises, des framboises, des

pommes et des prunes, mais aussi des insectes (le Géotrupe et la Grande sauterelle verte), des œufs, des passereaux, des poules et des petits mammifères (musaraignes, campagnols, surmulot, rats, mulots, souris, lérot). La fouine ingère également des végétaux, essentiellement du millet et du chiendent, pour favoriser le transit intestinal et éliminer les parasites. Ce régime omnivore très éclectique est typique d'un prédateur opportuniste tout à fait généraliste.

COMMENT SE REPRODUIT-ELLE ?

Sa reproduction est identique à celle de la martre. Le rut a lieu de juin à août et les embryons ne s'implanteront dans la membrane utérine qu'en hiver. Au printemps, la femelle donnera naissance à deux à cinq petits qui seront allaités pendant deux mois.

Comme partout en France, la fouine est commune en Bourgogne. Les greniers des habitations sont visités par ce mustélidé qui y chasse activement les rongeurs indésirables. Ce raticide naturel peut se faufiler dans un trou de 8 cm de diamètre. Sa mauvaise réputation tient au fait d'individus effectuant des carnages dans les poulaillers. Sa présence est également mal tolérée à cause des dégâts dans les matériaux d'isolation (la laine de verre), des joutes bruyantes entre les individus à la période des amours et des dépôts de crottes (crottoir) nauséabonds.

L'ENQUÊTE SUR LES MAMMIFÈRES DE BOURGOGNE SE POURSUIT ET LA FOUINE EN FAIT PARTIE !

Tu as certainement connaissance d'un individu vivant chez toi ou à proximité de chez toi. Aide-nous à recenser l'espèce et à compléter la carte de Bourgogne.

Rends-toi sur www.bourgogne-nature.fr et participe aux E-Observations. Chacune de tes observations est validée par des experts qui participent aussi à l'Observatoire de la Faune sauvage de Bourgogne. Ton aide nous est donc très utile dans cette tâche ! Tu participes ainsi à l'inventaire régional de la Nature et tes observations nous permettent d'étudier la dynamique des populations, leur répartition sur le territoire, etc. que ce soit à la campagne ou en ville.



Contact

Observatoire de la
FAune de Bourgogne



Damien LERAT - Mammalogiste
Société d'histoire naturelle d'Autun

shna.damien@orange.fr

www.shna-autun.net

www.bourgogne-nature.fr

03 86 78 79 72

