

Le campagnol agreste

Microtus agrestis

TC : 85-130 mm

Q : 25-46 mm

P : 28-48 g



D. SIRUGUE

Ce campagnol ressemble beaucoup au campagnol des champs mais il est d'une taille plus forte (c'est le plus gros des campagnols). Son pelage est sombre et plus « hirsute », et les poils des joues lissés vers l'arrière recouvrent l'oreille.

La campagnol agreste colonise les milieux humides et non monotones : marais, cariçaises, jonchaies, bruyères humides, landes à molinies, berges herbeuses des ruisseaux, tourbières, zones de recolonisation forestière. Le facteur le plus important conditionnant sa présence est un couvert herbacé graminéen très dense et assez élevé, comme les friches et les jeunes plantations.

Le campagnol agreste, essentiellement herbivore, se nourrit de jeunes pousses et des parties vertes des plantes.

Son mode de vie est moins souterrain que le campagnol des champs et il peut faire son nid à la surface du sol sous une pierre ou une souche. Le rythme circadien est polyphasique comme celui du précédent avec deux pointes principales d'activité, le crépuscule et l'aube. La période de reproduction s'étend d'avril à octobre et l'activité sexuelle pendant l'hiver est rare. La femelle a plusieurs portées par an de 3 à 8 petits.



Présent sur tout le territoire français mis à part la Corse, le campagnol agreste est présent en Bourgogne. Faisant toujours partie des proies de la chouette effraie, son abondance relative varie en fonction inverse de la densité de campagnol des champs. C'est dans le Haut-Morvan montagnard que ses populations sont les plus importantes en avoisinant les 15 % dans le régime ali-

Anglais : *field vole*. Allemand : *Erdwühlmaus*.
 Hollandais : *aardmuis*. Italien : *campagnolo agreste*.



A propos de...

Différencier les petits campagnols sur le terrain.




	Campagnol roussâtre	Campagnol des champs	Campagnol agreste	Campagnol souterrain
queue	1/2 (tête et corps)	petite, 1/3 (tête et corps), unicolore	petite, 1/3 (tête et corps), plus claire dessous	petite = 1/3 (tête et corps)
yeux	"normaux"	"normaux"	"normaux"	très petits
pelage	- pelage roussâtre	- pelage roux grisâtre - poils d'apparence souple et plate	- pelage plus sombre avec des poils noirs - poils d'apparence raide et hirsute	- pelage gris cendré plus pâle sur le ventre - poils très serrés
oreilles	lobes bien visibles	lobes dépassant le pelage ras	lobes cachés par le pelage	enfouies dans la fourrure
ped postérieur	6 callosités 	6 callosités 	6 callosités 	5 callosités 

mentaire de la chouette contre 1,7 à 6 % en périphérie. Ainsi, quand le campagnol des champs se fait rare, le campagnol agreste constitue la proie de remplacement. En Angleterre, comme le campagnol des champs est absent, le campagnol agreste devient la proie principale des rapaces.



R. LIBOIS.



Le campagnol agreste est très commun.